

狂犬病衛教宣導

狂犬病由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病後，致死率高達100%，但如能在動物咬傷後，及時就醫，接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效的降低發病的風險。

➤ 發病症狀：

狂犬病初期症狀包括發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛等，咬傷部位會出現異樣感的症狀，持續數天後，病患會出現興奮及恐懼的現象，然後發展到麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉之痙攣，引起恐水之症狀（所以又稱為恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐。

➤ 預防方法：

1. 不碰觸、逗弄野生動物。
2. 不撿拾生病的野生動物、屍體，請洽詢各地動物防疫機關。

一旦被動物咬傷時，請遵循1記、2沖、3送、4觀：

1. 記：保持冷靜，牢記動物特徵。
2. 沖：用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口。
3. 送：儘速送醫評估是否要接種疫苗。
4. 觀：儘可能將咬人動物繫留觀察10天。若動物兇性大發，不要冒險捕捉。

➤ 若不慎被動物咬傷，本縣市可至彰化醫院、彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院就醫處理。



白鼻心



石虎



棕葉貓



黃鼬狼



鼬獾



麝香貓

預防 狂犬病 多警覺 ▲ 多安心

認識狂犬病

- 傳染途徑：99%是經由動物抓咬傷所造成。已感染狂犬病的動物咬傷人，病毒藉由唾液進入傷口，破壞中樞神經系統
- 潛伏期：約1-3個月，也可能是1週至7年
- 症狀：初期症狀發熱、喉嚨痛等、咬傷處有異樣感；數天後，病患會出現興奮、恐懼、麻痺、吞嚥困難、咽喉部肌肉痙攣(恐水症)，隨後會發生精神錯亂及抽搐。

人用狂犬病疫苗接種對象

- 1 被咬傷後 預防接種，經醫師評估，符合建議接種者，一定打得到
需接種5劑疫苗，第0天、3天、7天、14天、21或28天。僅有傷口嚴重或大面積時，需由醫師評估增加使用免疫球蛋白1劑。
- 2 被咬傷前 預防接種
需接種3劑疫苗，第0天、7天、21或28天。依風險高低，由政府依序通知至指定地點接種。
 - 1 第一線動物防疫人員及捕犬人員
 - 2 動物收容所相關業務人員
 - 3 開業獸醫師

提高警覺 預防狂犬病

- 如何預防被動物咬傷？
 - 1 不碰觸野生動物
 - 2 不撿拾生病的野生動物、屍體，遇疑似狂犬病動物時，可洽詢各地動物防疫機關或電洽0800-761-590
- 被動物抓咬傷，請遵循「1記」、「2沖」、「3送」、「4觀」



▲ 到那裡就醫？ 各縣市都有人用狂犬病疫苗儲備醫院 查詢醫院，請洽1922防疫專線

臨床醫師遇被動物抓咬傷的患者，除消毒及處置傷口、施打破傷風類毒素外，同時評估該動物特性、病患傷口嚴重性等，若需要施打人用狂犬病疫苗，請儘速轉至疫苗儲備醫院提出申請。